



DAVID SHUSTERMAN, MD
201 E65TH STREET, NEW YORK, NY 10065
69-15 YELLOWSTONE BLVD, FOREST HILLS, NY 11375
(TEL) 212-931-8533 (FAX) 888-331-9568

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ TRIMIX

(PAPAVERINEREGITINEL PROSTAGLANDIN E-1)

1. необходимый интервал между уколами--3 дня.
2. Не делайте больше чем 6 уколов в месяц.
3. храните лекарство в холодильнике, т.к. его эффект уменьшается, если оно хранится при повышенной температуре.
4. первая доза--0.1 сс.ждите 3 дня прежде чем увеличить дозу.увеличивайте дозу постепенно не больше чем на 0.05 сс . максимальная доза--0.5 сс. не расстраивайтесь если нет необходимого эффекта после первого укола. первая доза должна быть низкой чтобы исключить продолжительную и болезненную эрекцию.
5. вам необходимо вернуться в офис на проверку через один месяц; иметь при себе таблицу инъекций с датой и дозой введенного препарата.

ДАТА	ДОЗА	сторона для инъекции

- 6. если эрекция длится более чем 1.5 часа , можно принять Sudafed 60 мг (продается в аптеке без рецепта), положить лед и подождать еще примерно 1 час. если эрекция все еще держится, немедленно звоните в наш офис 718-360-9550 или обратитесь в близлежащий госпиталь в нерабочие часы офиса.**
- 7. По любым имеющимся у вас вопросам по использованию препарата или инструкции звоните в офис 718-360-9550.**

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ.

- а) *строгая гигиена очень важна!*
- б) *перед началом инъекции помойте руки и будьте уверены, что пенис чистый.*
- с) *приготовьте:*
 - TRIMIX
 - алкогольную салфетку
 - шприц
- д) *TRIMIX должен быть холодным; опустите бутылочку с лекарством в сосуд со льдом.*

2. ПОДГОТОВКА ШПРИЦА.

- а) *протрите резиновую крышку бутылочки алкогольной салфеткой.*
- б) *после снятия колпачка с иглы отведите стержень шприца вниз на размер требуемой дозы. Используйте новый шприц и иглу каждый раз!*
- с) *введите иглу в бутылочку и впустите воздух во внутрь.*
- д) *переверните бутылочку с иглой, медленно отводите стержень шприца вниз пока не наберете требуемое количество лекарства.*
- е) *постучите по стенке шприца чтобы воздух поднялся к игле. будьте уверены что воздуха в шприце нет, делая инъекцию самостоятельно!*
- ф) *вытащите иглу из бутылочки и наденьте колпачек обратно на иглу.*

3. ВЫБРАТЬ И ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ.

- а) *лучшее место для укола--"9-11" или "1-3" позиции между основанием и серединой пениса. Избегайте среднюю линию пениса, чтобы не повредить мочеиспускательный канал (6 часов), а так же артерии и нервы (около 12 часов). избегайте видимые вены или артерии на поверхности!*
- б) *оттяните головку пениса в сторону, выберите поверхность для инъекции.*
- с) *продезинфицируйте поверхность алкогольной салфеткой.*

4. ТЕХНИКА УКОЛА.

- а) *уверенным движением проколите кожу иглой под углом 90 градусов. игла должна войти до середины, вы должны почувствовать легкое сопротивление.*
- б) *начните вводить препарат TRIMIX в течении 4 секунд. затем, вытащите иглу из пениса и прижмите место укола алкогольной салфеткой в течении 1 мин, чтобы избежать кровотечения, особенно если вы принимаете аспирин.*
- с) *вновь наденьте колпачек на иглу со шприцем и выбросите.*

По любым возникшим у вас вопросам по использованию препарата или инструкции звоните в офис 718-360-9550